

Số: /TB-TT&BVTV

Phú Thọ, ngày tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Tình hình sinh vật gây hại (SVGH) 07 ngày trên lúa và biện pháp phòng trừ
(Từ ngày 28/4 đến 05/5/2021 và dự báo trong 7 ngày tới)

Hiện nay, lúa Xuân Trà 1 đang chín sấp - chín, Trà 2 chủ yếu ở giai đoạn chín sữa (còn khoảng 800 ha lúa các huyện Tân Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, Thanh Sơn đang trổ - phơi màu). Qua kết quả điều tra SVGH tuần 18 (04 - 05/4) cho thấy một số đối tượng SVGH tiếp tục phát sinh, có thể ảnh hưởng tới năng suất cây lúa cuối vụ. Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình SVGH, dự báo trong thời gian tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau:

I/ TÌNH HÌNH SVGH VÀ DỰ BÁO 7 NGÀY TỚI:

1. Bệnh bạc lá:

* **Hiện tại:** Bệnh phát sinh rải rác ở hầu hết các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,6 - 3,3%; cao 5,6 - 18,8%; cấp bệnh phổ biến: Cấp 1. Diện tích nhiễm 105,7 ha (Thấp hơn so với CKNT 214,5 ha), chủ yếu nhiễm nhẹ; diện tích đã phòng trừ 11,4 ha.

* **Dự báo:** Trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào, kèm theo dông lốc, bệnh sẽ tiếp tục gia tăng, gây hại. Mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng trên các ruộng xanh tốt, lá rậm rạp, nhất là trên diện tích đã xuất hiện nguồn bệnh. **Các huyện cần chú ý: Lâm Thao, Thanh Thủy, TP. Việt Trì, Hạ Hòa, Tam Nông, Phú Ninh, Thanh Ba, Cẩm Khê, ...**

2. Bệnh khô vằn:

* **Hiện tại:** Bệnh phát sinh ở tất cả các trà lúa tại các huyện, thành, thị. Tỷ lệ bệnh phổ biến 0,5 - 7,1%; cao 10 - 28,5%; cục bộ 30,5 - 41,2% (Thụy Vân, Sông Lô - TP. Việt Trì; Thanh Uyên, Tề Lễ - Tam Nông), cấp bệnh phổ biến: Cấp 1, 3. Diện tích nhiễm 3.144 ha (Thấp hơn so với CKNT 673,2 ha), trong đó diện tích nhiễm nhẹ 2.347,84 ha, trung bình 774,2 ha, nặng 22 ha; diện tích đã phòng trừ 717,8 ha.

* **Dự báo:** Trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẽ, ẩm độ không khí cao, bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan và gây hại trên tất cả các trà lúa, nhất là trên những giống có bản lá to mềm, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng (gây tỷ lệ lép lửng cao). Cần lưu ý trên lúa Trà 2 đang và các diện tích lúa trổ muộn tại các huyện Tân Sơn, Đoan Hùng, Yên Lập, Thanh Sơn.

3. Rầy các loại:

* **Hiện tại:** Gây hại rải rác tại một số huyện, thành, thị. Mật độ rầy phổ biến 16 - 76 con/m², cao 112 - 810 con/m², phát dục chủ yếu: Tuổi 1,2. Diện tích nhiễm 130,9 ha (chủ yếu nhiễm nhẹ) tại huyện Tân Sơn. Mật độ trứng rầy phổ

biển 16 - 40 ỏ/m², cao 80 - 220 ỏ/m² (TP.Việt Trì, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông).

* **Dự báo:** Trong kỳ tới, thời tiết được dự báo có nắng mưa xen kẽ, rất thuận lợi cho rầy tiếp tục tích lũy và gia tăng mật độ, gây hại cục bộ trên các trà lúa vào đầu đến giữa tháng 5, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ ổ nặng, gây cháy chòm, cháy ổ trên diện tích lúa đang chín sấp. **Các huyện cần chú ý: TP. Việt Trì, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Tam Nông, Tân Sơn, ...**

4. Ngoài ra: Sâu đục thân, gây hại nhẹ, rải rác. Chuột hại nhẹ, cục bộ.

II/ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:

1. Biện pháp chỉ đạo:

- Đề nghị UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân chuẩn bị thu hoạch lúa xuân Trà 1 đã chín đảm bảo nhanh gọn, tránh ảnh hưởng của mưa bão và lũ Tiểu mãn. Đối với Trà 2 tiếp tục kiểm tra đồng ruộng và phòng trừ các ổ sâu bệnh theo hướng dẫn của Chi cục/trạm Trồng trọt và BVTV.

- Đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội phối hợp thông tin, tuyên truyền đến hội viên thu hoạch lúa nhanh, gọn theo phương châm "**Xanh nhà hơn già đồng**" để tránh mưa lớn, bão lũ, ngập úng... đồng thời thực hiện phòng trừ sâu bệnh trên lúa đang trổ - chín sữa có hiệu quả, bảo vệ sản xuất và môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

- Chi cục Trồng trọt và BVTV yêu cầu các Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, thành, thị tiếp tục tăng cường điều tra, DTDB chính xác về quy mô, mức độ gây hại, ban hành thông báo hàng tuần và tham mưu cho các Cấp ủy, Chính quyền địa phương các biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời có hiệu quả.

2. Kỹ thuật phòng trừ (đối với Trà 2):

- **Bệnh bạc lá:** Sau mưa đông, cần kiểm tra ngay đồng ruộng. Nếu phát hiện ruộng chớm bị bệnh, cần phun phòng trừ ngay bằng các thuốc đã được đăng ký trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng (ví dụ như Starwiner 20WP, Kamsu 2SL, Xanthomix 20WP, Sasa 25WP, Kasumin 2SL, Totan 200WP, Avalon 8WP, ViSen 20SC, Bisomin 6WP, ...).

- **Bệnh khô vằn:** Khi ruộng lúa nhiễm bệnh có tỷ lệ đánh hại trên 20%, tiến hành phun trừ bằng các loại thuốc có trong danh mục, ví dụ: Chevin 5SC, Saizole 5EC, Nativo 750WG, Clearner 75WP, Valicare 8SL, Lervil 50SC, Valivithaco 5SL, Damycine 5SL/5WP, ...

- **Rầy các loại:** Phòng trừ khi mật độ rầy cám trên 1.500 con/m² (30-40 con/khóm).

+ Đối với ruộng lúa chưa chín sấp có thể dùng một trong số các loại thuốc như Comda gold 5WG, Chersieu75 WG, Nibas 50 EC, Superista 25 EC, Midan 10 WP, Hichespro 500WP, Chess 50WG, ...

+ Đối với ruộng lúa đang chín sấp thì chỉ dùng thuốc tiếp xúc, ví dụ: Nibas 50 EC, Boxing 405EC, Babsax 40WP, ... khi phun cần rẽ băng từ 0,8 - 1m, phun kỹ vào gốc lúa.

(Chú ý: Thu gom triệt để bao gói thuốc BVTV sau sử dụng để vào bể chứa hoặc nơi quy định của địa phương).

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Thọ thông báo và kính đề nghị UBND các huyện, thành, thị quan tâm chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Sở NN và PTNT: Ô. Anh - PGĐ (b/c);
- Hội Nông dân tỉnh (PH);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Phòng KHTC sở, TTKN;
- Các phòng/trạm chi cục;
- Website Chi cục;
- Lưu: VT .

CHI CỤC TRƯỞNG

Phan Văn Đạo